

Acr-Bis(40%:2%)

产品简介

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30%Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液,其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%:2%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 20:1,丙烯酸胺总量为 42%, 常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS057E0	
Acr-Bis(40%:2%)	500ml	4℃避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项

- 1、Acr-Bis(40%:2%)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。常温运输, 4℃保存。